

Proatlantal İntersegmental Arter Varyasyonu ile Birlikte Posterior Dolaşım İskemisine Sekonder Epileptik Nöbet: Olgu Sunumu

Yiğit Can Güldiken¹, Ayşenur Bakan²

¹Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çanakkale

²Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çanakkale


AMAÇ: Proatlantal intersegmental arter (PIA), embriyonik dönemde kalıcı kalan nadir bir karotid–vertebrobaziler anastomozdur. Çoğunlukla insidental saptansa da posterior dolaşım iskemisi ve nadiren epileptik nöbetlerle ilişkili olabilir. Bu bildiride, jeneralize tonik-klonik nöbet ve talamik infarkt ile başvuran bir PIA olgusu sunulmaktadır.

OLGU: Altmış dokuz yaşında kadın hasta yemek sırasında ani bilinç kaybı ve jeneralize tonik-klonik nöbet ile acil servise getirildi. GKS 4 olup entübe edildi. Acilde 3000 mg levitirasetam yükleme sonrası idame tedavisine geçildi. Takibinde bilinci hızla açıldı. Nörolojik muayenede sol hemiparezi saptandı. Başlangıç BT'si normal iken kontrol BT'de sağ talamusta infarkt görüldü. EEG'de epileptiform aktivite izlenmedi. BT anjiyografide sağ tarafta PIA varyasyonu ve bilateral vertebral arterlerde ince kalibrasyon raporlandı.


SONUÇ: PIA genellikle asemptomatik olsa da, vertebral arter anomalileriyle birlikte posterior dolaşımın hemodinamik dengesini bozarak klinik açıdan önem kazanabilir. Bu olgu, PIA'nın hem iskemik inme hem de sekonder epileptik nöbet açısından dikkate alınması gereken bir vasküler varyant olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: proatlantal arter, epileptik nöbet, talamik infarkt, vasküler varyasyon

BT Anjiyografi, beyin



BT beyin kontrastsız



Detaylar

Durum : Kabul:Poster

Sunum Şekli : Poster Sunum

Bildiri Grubu : Beyin Damar Hastalıkları

Dili : Türkçe

Saved: : 21.09.2025 21:35:29

Submit: : 21.09.2025 22:36:46

Yazar ve Editöre Özel Bilgiler

Sunan Yazar : Yiğit Can Güldiken (canguldiken@hotmail.com)

Kapat

Yazdır